



ג' באב, התשפ"א
12/07/2021

סימוכין : 533417421

לכבוד :

רופאי המחוזות והנפות

מנהלי האגפים הרפואיים, קופת החולים

מנהלי בתי החולים הכלליים

מנהלי בתי החולים הפסיכיאטריים

מנהלי בתי החולים הגריאטריים

מר אלי בין, מנכ"ל מד"א

הנדון: פרוטוקול למתן מנה שלישית של תרכיבי mRNA נגד COVID-19 למדוכאי חיסון

סימוכין: תרכיבים נגד נגיף קורונה החדש, תדריך החיסונים, עדכון 5, מס' 507342021

יש עדות מצטברת שמטופלים הסובלים מדיכוי חיסוני אינם מפתחים תגובה נוגדנית מספקת לאחר 2 מנות של חיסון נגד נגיף הקורונה, וחלקם עשויים לפתח נוגדנים לאחר מנה שלישית. לאור העלייה בתחלואה והתפשטות הנגיף בשבועות האחרונים והסיכון הגבוה למדוכאי חיסון לחלות בתחלואה קשה, ניתן לחסן מטופלים אלה במנה שלישית.

ההגדרה של דיכוי חיסוני נקבעה עם האיגודים המקצועיים הבאים: האיגוד הישראלי למחלות זיהומיות, החברה הישראלית להשתלות, האיגוד הישראלי לראומטולוגיה, והאיגוד הישראלי להמטולוגיה ולרפואת עירוניים

1. אוכלוסיית היעד לקבלת המנה השלישית כוללת את הקבוצות הבאות :

קבוצה א' – מושתלי לב, ריאה וכליות.

ניתן לחסן במנה שלישית ללא צורך בבדיקת נוגדנים לפני או אחרי המנה השלישית



קבוצה ב' –

- מושתלי כבד
- מושתלי מח עצם אלוגנאי בעלי כימריזם מלא של תורם וללא מחלת השתל נגד המארח (graft vs. host disease) חדה דרגה 3-4.
- מושתלי מח עצם עצמית לאחר שקיבלו חיסון
- מחלת השתל נגד המארח בינונית/חמורה המטופל ב-0.5 מ"ג/ק"ג או בתהליך התקדמות.
- חולים עם מחלות מיאלופרוליפרטיביות המקבלים טיפול
- חולים עם מיאלודיספלסיה
- חולים במחלות לימפופרוליפרטיביות (כגון לימפומה או CLL - chronic lymphocytic leukemia)
- חולים עם CML – chronic myelogenous leukemia
- חולים עם indolent lymphoma שלא טופלו מעולם
- חולים עם Hodgkin Lymphoma אשר טופלו ב-3 שנים האחרונות.
- מטופלי לימפומה שטופלו לפני למעלה מחצי שנה גזיבה/ מבטרה
- מטופלים עם לימפומות שטופלו ב 3 שנים האחרונות(ללא מבטרה או גזיבה)
- חולים עם מיאלומה נפוצה
- חולים עם לאוקמיה מיאלואידית/לימפטית
- כלל חולי CAR T CELLS
- חולים אונקולוגיים המטופלים בכמותרפיה, טיפול אימוני או ביולוגי
- חולים עם המוגלובינפתיה (בפרט אנמיה חרמשית או תלסמיה – לשיקול דעת יחידני)
- חולים עם טרשת נפוצה המטופלים ב-fingolomod או ocrelizumab
- חולים במחלות ראומטולוגיות או אוטו-אימוניות המטופלים באחת או יותר מתרופות הבאות:
 - Rituximab או טיפול anti CD20 אחר (עדיף 6 חדשים לפחות מסיום הטיפול)
 - Mycophenolate mofetil (MMF)
 - Abatacept
 - Prednisone במינון של 20 מ"ג ליום באופן קבוע
- חולים הסובלים מליקוי ראשוני במערכת החיסון (primary immunodeficiency).



מומלץ לבצע בדיקה סרולוגית לפחות 14 יום לאחר מתן מנת החיסון השנייה ולפני מתן המנה השלישית. אין צורך להמתין לתוצאת הבדיקה כדי לחסן במנה השלישית.

2. מתן מנה שלישית

2.1 עיתוי המנה – המרווח המומלץ בין המנה השנייה לשלישית הינו 8 שבועות, והמרווח המינימום הינו 4 שבועות. אין גבול עליון למתן המנה השלישית לאחר המנה השנייה.

2.2 הדיווח על מתן המנה יהיה כמקובל. בהמשך יהיה צורך בדיווח על ההתוויה לפיה ניתנה מנה זו.

3. הערכה לאחר המנה השלישית

3.1 מומלץ לבצע בדיקת נוגדנים ל-SARS-CoV-2 IgG לפחות 14 ימים לאחר המנה השלישית.

3.2 בשלב זה, אין לתת מנות נוספות של התרכיב אחרי המנה השלישית, גם אם אין עדות לנוגדנים אחרי מנה זו.

3.3 מומלץ שמדוכאי חיסון ימשיכו להקפיד על אמצעי מניעה לא-פרמקולוגיים כגון עטית מסכת פה-אף, שמירה על היגיינה וממגע עם אנשים חולים ו/או לא מחוסנים נגד נגיף הקורונה, ומניעה מלהשתתף בהתקהלויות בנוסף לקבלת חיסונים על פי ההנחיות.

תדריך החיסונים יועדכן בהתאם.

הואילו להעביר הנחיות אלו לכל הנוגעים בדבר במוסדכם.

בברכה,

אמיס'יה אנים

ד"ר אמיליה אנים

מנהלת האגף לאפידמיולוגיה